

# ANTIHIPERTENSIVOS EN PREECLAMPSIA CON DATOS DE SEVERIDAD



## DATOS DE SEVERIDAD:

- $TA \geq 160/110$  mmHg
- Trombocitopenia  $< 100,000$
- Elevación de transaminasas
- Dolor en epigastrio o hipocondrio derecho
- Creatinina  $> 1.1$  mg/dL o el doble del basal
- Edema pulmonar
- Alteraciones visuales o cerebrales



Tiempo (min)	<b>LABETALOL</b> IV (mg)	<b>HIDRALAZINA</b> IV (mg)	<b>NIFEDIPINO</b> VO (mg)
<b>0</b>	20	5 - 10	10
<b>10</b>	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg 40	Evaluar la tensión arterial	Evaluar la tensión arterial
<b>20</b>	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg 80	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg 10	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg 20
<b>30</b>	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg 10 ó Hidralazina	Evaluar la tensión arterial	Evaluar la tensión arterial
<b>40</b>	Evaluar la tensión arterial	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg 40 ó Labetalol	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg 20
<b>50</b>	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg alternativas	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg alternativas	TAS $\geq 160$ ó TAD $\geq 110$ mmHg 20 ó Labetalol

TAS  $\geq 160$  ó TAD  $\geq 110$  mmHg y persistente por 15 minutos