

"PUSH DOSE" EPINEFRINA



PREPARACIÓN



Epinefrina: Ámpula 1 mg/1 ml:
Concentración: 1000 mcg en 1 ml



Paso 1: Aforar la ámpula en 10 cc de SS al 0.9%:
Concentración: 1000 mcg en 10 ml → 100 mcg = 1 ml





Paso 2: Aforar 1 ml en 10 cc de SS al 0.9%:
Concentración: 100 mcg en 10 ml → 10 mcg = 1 ml



Paso 3: Administrar 1 ml de esa dilucion (10 mcg) cada 2-3 minutos hasta alcanzar metas de PAS y PAM.

- **Indicación:** manejo de la hipotensión en choque.
- **Efectos:** vasoconstricción e inotropismo.
- **Inicio del efecto:** 1 min.
- **Duración:** 5 - 10 min.
- **Dosis:** 10-20 mcg en una dilución (1:100,000).
- **Intervalo de administración:** cada 2 min.
- **Metas:** PAS >90 mmHg y PAM >65 mmHg.



Muestra: 58 Pacientes críticos que durante su traslado a un nosocomio cursaron con inestabilidad hemodinámica.

Terapéutica: a nivel pre-hospitalario recibieron el bolo de epinefrina a 10 mcg en 1 ml cada 2 min.