

Manejo del EVC Isquémico:

PATTOS




P

PRESIÓN ARTERIAL

Cifras:


- **Candidato a fibrinólisis:** <185/110 mmHg.
- **No candidato a fibrinólisis:** permisiva, disminuirla 15% en 24 hrs sólo si >220/120 mmHg ó daño concomitante a órgano blanco.



A

AZÚCAR (GLUCEMIA)


Meta glucemia: 140-180 mg/dL.
¡Evitar hipoglucemia!



T

TEMPERATURA


Mantener normotermia:
temperatura central <38.0°C.
Hipotermia terapéutica SÓLO ensayos clínicos.



T

TROMBÓLISIS


Administrar Alteplasa IV dentro del período de ventana <4.5 hrs. en ausencia de contraindicaciones para su uso.
Tiempo puerta-aguja: <60 min.



O

OXÍGENO


Oxígeno suplementario sólo si SO_2 <94%



S

SOLUCIONES

Considerar su uso sólo en caso de hipotensión ó hipovolemia.
¡Evitar soluciones glucosadas!



Autoría: Daniel López Tapia.

Colaboración: Karla Muñiz, Eder Zamarrón.

Referencia:

2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association